

B-*Quiet*

destressant

Utilisation

B-QUIET s'utilise pour chevaux ou poneys nerveux ou anxieux. Il peut être distribué aux animaux difficiles pendant l'entraînement, la compétition et le transport. B-QUIET répond aux besoins nutritifs du cheval anxieux.

Propriétés

Le magnésium et les vitamines du groupe B, spécialement la B1 (Thiamine) sont employées traditionnellement par les professionnels du cheval pour préserver l'équilibre nerveux et musculaire. .

Les céréales, principale partie de l'alimentation, ont une teneur traditionnellement faible en magnésium.

Le L- Tryptophane est un acide aminé essentiel que le corps ne peut synthétiser lui même, le cheval devant le trouver dans une alimentation riche en protéines. Il est connu pour ses effets apaisants sur le mental du cheval.

La formule B-QUIET est très concentrée en L-Tryptophane.

Le magnésium et autres vitamines B (particulièrement la Pyridoxine - B6) interviennent dans le mécanisme de transformation du Tryptophane.

La supplémentation avec B QUIET conserve toute l'intégrité physiologique et les capacités sportives du cheval de compétition.

Composition: sucrose, glycerol, sorbitol, sulfate de magnésium

Formule liquide :

Constituants analytiques:

Humidité	45,2 %
Protéines brutes	3,0 %
Matières grasses brutes	0,1 %
Cendres brutes	0,8 %
Cellulose brute	0,1 %
Magnésium	0.16 %

Additifs nutritionnels au litre:

Vitamines:

Vitamine B1	2 479 mg
Vitamine B6	826 mg

Vitamine B12	2 150 µg
Niacine	1 653 mg
acides aminés:	
L- Tryptophane	33 058 mg

Seringue orale :

Constituants analytiques :

Humidité	44,1 %
Cendres brutes	3 %
Protéines brutes	2,4 %
Matières grasses brutes	0,1 %
Cellulose brute	0,2 %
Magnésium	0.16 %

Additifs nutritionnels au kilo:

Vitamines:

Vitamine B1	2 400 mg
Vitamine B6	800 mg
Vitamine B12	2 080 µg
Niacine	1 600 mg

Acides aminés:

L- Tryptophane	32 000 mg
----------------------	-----------



Mode d'emploi

Liquide :

- Chevaux : 50 ml mélangés à la ration journalière.
 - Poneys et chevaux de petites races : 25 ml mélangés à la ration journalière.
- Pour un résultat optimum, distribuer durant au moins 7 à 10 jours.

Pâte Orale :

Distribuer directement dans la bouche une seringue entière 1 à 2 heures avant la compétition.

Catégorie

Aliment complémentaire

Précautions d'emploi

Formulé pour les équidés – Tenir hors de portée des enfants

Conserver dans un endroit sec - Bien agiter avant utilisation - Bien refermer après usage

Présentation: Liquide, Pâte orale

Flacon doseur de 1 L - ACL 4546003

GTIN 3661716105051

Seringue orale de 60 ml - ACL 4545995

GTIN 3661716105068

Ce label garantit qu'aucune substance prohibée n'a été utilisée lors de la fabrication du produit et que le dépistage de la présence d'éventuels contaminants dopants a été effectué par le Laboratoire des Courses Hippiques (LCH).

